

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha: 1,22 ha

Druhy, které jsou předmětem ochrany:

Hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohémica*)

Bradáček vejčitý



Copyright © Ing. Alexandra Čurnová



www.south-life.cz

www.facebook.com/czsksouthlife

Autor fotografií:
Ing. Alexandra Čurnová

Tento leták vznikl v rámci projektu LIFE16 NAT/CZ/000001
Optimalizace managementu lokalit soustavy Natura 2000
v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku, který byl podpořený
z komunitárního programu Evropské Unie LIFE.



Ministerstvo životního prostředí



EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

CZ0312036 Kozlovská stráň

Více informací na:
www.south-life.cz



Copyright © Ing. Alexandra Čurnová



Hořec brvitý

Copyright © Ing. Alexandra Čurnová

ÚVODNÍ INFORMACE

Přírodní památka Kozlovská stráň byla zřízena v roce 2011 z důvodu ochrany evropsky významné lokality. Předmětem evropské ochrany je lokalita výskytu taxonu hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*). Přírodní památka Kozlovská stráň se nachází z hlediska biogeografického členění v sušickém bioregionu, z hlediska fyto geografického členění v podokrese Sušicko – Horažďovické vápence, v nadmořské výšce cca 414–426 m.

Mapa lokality



HISTORIE LOKALITY

Stráň sloužila v minulosti jako pastvina především ovcí a koz, ještě v 70. letech 20. století byla občasně přepasena dobyt看em. Po ukončení pastvy začala silně zarůstat křovinami. V polovině devadesátých let byla zalesněna borovicí. Mladý porost borovice byl do roku 2001 pravidelně vyžínán, od roku 2002 byl ponechán bez zásahu a během několika let se prakticky zapojil v hustý les a hořečky vymizely. O několik let později byly borovice silně prořezány, byl zaveden pravidelný management a populace hořečků se obnovila. Kromě hořečku zde rostou i další zajímavé rostliny jako nádherný modře kvetoucí hořec brvitý (*Gentianopsis ciliata*) nebo nenápadná orchidej bradáček vejčitý (*Listera ovata*). Pozůstatkem po pastvě jsou keře jalovce obecného (*Juniperus communis*).



CÍLE V LOKALITĚ A PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ

- odstraníme negativní vliv okolního prostředí na populaci hořečku – stínění a rozšíření nežádoucích druhů

HOŘEČEK

Hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*) je endemitem Českého masivu. Jeho historický areál zahrnuje Českou republiku, severní Rakousko, Bavorsko a jižní Polsko. V Čechách se historicky vyskytoval na většině území kromě západních a severozápadních Čech a jihovýchodní a východní Moravy. Úbytek lokalit výskytu druhu i jejich rozlohy souvisí pravděpodobně především se změnami hospodaření v krajině, zejména s přerušením pastvy ovcí a koz, zarůstáním nebo cíleným zalesňováním stanovišť a eutrofizací. Výrazný úbytek lokalit pokračuje až do dnešní doby.

