

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha: 1,27 ha

Stanoviště, které jsou předmětem ochrany:

6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky

Chřpa čekánek



Copyright © Prof. Vladislav Čurn



www.south-life.cz

www.facebook.com/czsksouthlife

Autoři fotografií:
Prof. Vladislav Čurn, Ing. Ivan Dudáček

Tento leták vznikl v rámci projektu LIFE16 NAT/CZ/000001
Optimalizace managementu lokalit soustavy Natura 2000
v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku, který byl podpořený
z komunitárního programu Evropské Unie LIFE.

EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

CZ0310063 Pastvina u Přešťovic

Více informací na:
www.south-life.cz



Copyright © Prof. Vladislav Čurn



Voskovka menší

Copyright © Prof. Vladislav Čurn




Ministerstvo životního prostředí



ÚVODNÍ INFORMACE

Přírodní památka Pastvina u Přestovic byla zřízena v roce 1985. Nachází se z hlediska biogeografického členění v sušickém bioregionu, z hlediska fyto geografického členění v podokrese Volyňské Předšumaví v nadmořské výšce cca 400 - 430 m. Od roku 2009 požívá zároveň evropské ochrany jakožto evropsky významná lokalita.

Mapa lokality



HISTORIE LOKALITY

Jak lze tušit z povrchu stráně, původně zde nejspíš byla dvě nebo tři malá políčka oddělená mezemi, které jsou dodnes mírně vyvýšeny. Po opuštění polí svah po desetiletí sloužil jako pastvina. Do západní části svahu byly zahlobbeny dva malé vápencové lomy. Lomy po opuštění zarostly náletem dřevin a pastva byla ukončena po 2. světové válce.

V současné době se jedná o botanicky velice zajímavou lokalitu. Nejvýznamnějším druhem je zde nenápadná vrabečnice roční (*Thymelaea passerina*), což je výrazně teplomilný druh. Naopak nápadné trsy vytváří modře kvetoucí hořec křížatý (*Gentiana cruciata*), přesazený sem z nedaleké zaniklé lokality, nebo voskovka menší (*Cerinth minor*), vytvářející lehce ojíněné trsy s vijany žlutých květů. V keřových porostech hnízdí ůhýk obecný (*Lanius collurio*).



Hořec křížatý

Copyright © Prof. Vladislav Čerm

CÍLE V LOKALITĚ A PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ

- odstraníme invazní keře a dřeviny mozaikovitým prořezem
- obnovíme přirozený charakter prioritních stanovišť - potlačíme šíření nežádoucích a invazních rostlin
- v prvních 3 letech budeme plochu intenzivně dvakrát ročně kosit a následně důkladně odstraníme biomasu



Ůhýk obecný

Copyright © Ing. Ivan Dudáček